

第6讲2.2可逆矩阵

第二章 矩阵及其运算

一、可逆的定义

- 定义:若同阶方阵 B 使 $AB = BA = E$, 则 A 可逆, $B = A^{-1}$ (唯一);
- 单侧推双侧: $AB = E \implies BA = E$ 。

二、抽象矩阵因式配凑通法

- 因式配凑:化为 (待求式) $\cdot M = E \implies (\text{待求式})^{-1} = M$;
- 循环轮换: $ABC = E \implies B(CA) = E, \mathbf{B^{-1} = CA}$ 。

警示 逆矩阵仅对方阵定义,长方形矩阵绝无逆!

例 2-2-1: 矩阵多项式配凑因式求逆

题: 典型例题 2-2-1: 多项式配凑因式求逆

设 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 满足矩阵方程

$$\mathbf{A}^2 + 3\mathbf{A} - 4\mathbf{E} = \mathbf{O},$$

证明 $\mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A} + 2\mathbf{E}$ 均可逆, 并分别求其逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 与 $(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})^{-1}$ 。

- **破题思想:** 本题无具体数值矩阵, 无法求行列式或伴随;
- **因式恒等:** 寻找形如 (待求式) $\cdot$ (多项式) $= k\mathbf{E}$ ($k \neq 0$) 的结构。

一、规范解答

- 求 $\mathbf{A}^{-1}$:移项提公因式 $\mathbf{A}$,两边除以 4:

$$\mathbf{A}(\mathbf{A} + 3\mathbf{E}) = 4\mathbf{E} \implies \mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathbf{A} + 3\mathbf{E}}{4}$$

- 求 $(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})^{-1}$:十字相乘拼凑,两边除以 6:

$$(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = \mathbf{A}^2 + 3\mathbf{A} + 2\mathbf{E} = 4\mathbf{E} + 2\mathbf{E} = 6\mathbf{E} \implies (\mathbf{A} + 2\mathbf{E})^{-1} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{E}}{6}$$

二、方法通则

抽象方阵求逆第一反应:因式分解配凑,化为 (目标) $\cdot \mathbf{M} = \mathbf{E}$ 。

题:典型例题 2-2-2:多矩阵连乘求逆

若设 A, B, C 均为 n 阶方阵,且满足

$$ABC = E,$$

证明 A, B, C 均可逆,并分别求 A^{-1}, B^{-1}, C^{-1} 。

- 核心特征:利用结合律结合前后矩阵;
- 思考关键:方阵乘积为单位阵时,其因式能否在乘积中循环移位?

例 2-2-2:规范解答与循环轮换律

一、规范解答

同阶方阵,利用结合律重组:

■ $A(BC) = E \implies A$ 可逆, $A^{-1} = BC$;

■ $(AB)C = E \implies C$ 可逆, $C^{-1} = AB$;

■ 循环轮换: $XY = E \iff YX = E$, 故 $(BC)A = E$, 即 $B(CA) = E$, $B^{-1} = CA$ 。

二、速记口诀

求谁的逆就把谁“拿走”, 剩余因式按原顺序首尾环形相扣!

一、可逆判据与伴随公式

■ 充要判据: $\mathbf{A}$ 可逆 $\iff |\mathbf{A}| \neq 0$ (非奇异 / 满秩);

■ 伴随求逆: $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^*\mathbf{A} = |\mathbf{A}|\mathbf{E} \implies \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{A}^*$ 。

二、二阶速算与运算法则

二阶速算口诀“主对调,副变号” ($ad \neq bc$): $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 。

■ 穿脱法则: $(\mathbf{A}\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$, $(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$, $(k\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{k}\mathbf{A}^{-1}$;

■ 同侧相乘: $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B} \implies \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ (左乘!)

例 2-2-3:二阶伴随求逆与矩阵方程求解

题:典型例题 2-2-3:二阶求逆与解矩阵方程

1. 求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$;
2. 求解矩阵方程:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

一、规范解答步骤

1. $|\mathbf{A}| = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0$ 。由口诀: $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。
2. 设系数矩阵 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, 其行列式 $|\mathbf{M}| = 8 - 3 = 5 \neq 0$, 故 $\mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。方程两边同时左乘 $\mathbf{M}^{-1}$:

$$\mathbf{X} = \mathbf{M}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{5} & 3 \\ 0 & \frac{3}{5} & -1 \end{pmatrix}.$$

二、警示

解方程 $\mathbf{MX} = \mathbf{B}$ 必须左乘 $\mathbf{M}^{-1}$ 得 $\mathbf{X} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{B}$, 严禁写成 $\mathbf{BM}^{-1}$!

例 2-2-4:含参矩阵方程因式分解与求解

题:典型例题 2-2-4:因式化简解矩阵方程

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且满足矩阵方程

$$\mathbf{AX} + \mathbf{E} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{X},$$

求未知矩阵 $\mathbf{X}$ 。

- **破题切入:**含 $\mathbf{X}$ 的项移到等号左边,其余移到右边;
- **避坑关键:**提公因式后先检验系数矩阵可逆,切莫盲目消去!

例 2-2-4:规范解答与避坑分析

一、规范解答步骤

■ 移项分解: $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{A}^2 - \mathbf{E} = (\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A} + \mathbf{E})$;

■ 检验可逆(核心得分点): $\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\mathbf{A} - \mathbf{E}| = -1 \neq 0$ (可逆!);

■ 左乘逆矩阵求解: 两边左乘 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1}$ 得

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

二、阅卷扣分雷区

必须先写出 $|\mathbf{A} - \mathbf{E}| \neq 0$ 确证可逆, 方能消去公因式; 盲目两边约分属严重逻辑跳步!

一、概念深度辨析题

若由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 必能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$, 其中 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 为同阶方阵, 则 $\mathbf{A}$ 应满足条件 (**D**):

(A) $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$

(B) $\mathbf{A} = \mathbf{E}$

(C) $|\mathbf{A}| = 0$

(D) $|\mathbf{A}| \neq 0$

二、深度

剖析

■ 移项得 $\mathbf{A}(\mathbf{B} - \mathbf{C}) = \mathbf{O}$;

■ 仅当 $\mathbf{A}$ 可逆 (即 $|\mathbf{A}| \neq 0$) 时, 两边才可左乘 $\mathbf{A}^{-1}$ 得到 $\mathbf{B} - \mathbf{C} = \mathbf{O} \implies \mathbf{B} = \mathbf{C}$;

■ 若仅有 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$, 由于存在非零零因子 (例如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{O}$), 无法推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ 。

一、知识架构速查

- 可逆充要: $\mathbf{A}$ 可逆 $\iff |\mathbf{A}| \neq 0$;
- 伴随求逆: $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^*$; 二阶口诀“主对调, 副变号”;
- 抽象配凑: 化为 $(\dots) \cdot \mathbf{M} = \mathbf{E}$;
- 矩阵方程: $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B} \implies \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ (同侧相乘)。

二、课后作业

- 《作业集》第 6 讲 (第 1~6 题);
- 复盘: 因式配凑与矩阵方程求解。

在线主页与课程资源

■ 个人主页:

<https://matnoble.top>

■ 课程专栏:

<https://matnoble.top/courses/>

■ GitHub 仓库:

<https://github.com/MatNoble>

自由交流与提问 (Q&A)

“学贵善疑,逻辑筑基”

感谢大家的专注聆听!

课件最新版本与补充资料见课程主页。

现在进入自由提问与交流时间。